

# **Base e Dimensão de um espaço Vetorial**

**ZAB0161 – “Álgebra linear com aplicações em geometria analítica”**

**Prof. Dr. Jorge Lizardo Díaz Calle**

**Dpto. de Ciências Básicas – FZEA – USP**

**16 de abril de 2020**

# 4. Base de um espaço vetorial


---

Definição: Seja  $E$  um espaço vetorial.

Um conjunto de vetores  $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subset E$  é **uma base de  $E$** , se:

a.  $S$  gera o espaço  $E$ , e

$(E, \oplus, \otimes)$




# 4. Base de um espaço vetorial

Definição: Seja  $E$  um espaço vetorial.

Um conjunto de vetores  $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subset E$  é **uma base de  $E$** , se:

a.  $S$  gera o espaço  $E$ , e

b.  $S$  é linearmente independente (L.I.).



## 4. Base de um espaço vetorial

---

Exemplo 1:  $S = \{t + 2, t^2 - 9, 2t - 4 + 3t^2\}$  é uma base de  $P_2$ . (Vide exemplo 3 do conceito 3.)

Exemplo 2:  $S = \{(-2, 0, -6), (1, -2, 1), (1, 0, 3)\}$  não é base de  $\mathbb{R}^3$ , pois não é gerador de  $\mathbb{R}^3$  e também não é LI.

Exemplo 3:  $S = \{(-2, -5), (1, -2), (0, 3)\}$  não é base de  $\mathbb{R}^2$ .  $S$  é gerador de  $\mathbb{R}^2$ , mas não é LI.

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Verificar, se um conjunto de vetores  $S$  é uma base de um espaço vetorial  $E$ , envolve duas combinações lineares, de

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Verificar, se um conjunto de vetores  $S$  é uma base de um espaço vetorial  $E$ , envolve duas combinações lineares, de

a. ser gerador: para todo  $v \in E$  devem existir

$$c_1, c_2, \dots, c_n \text{ talque } v = c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_nu_n$$

b. ser LI: se  $0 = d_1u_1 + d_2u_2 + \dots + d_nu_n$ ,

$$\text{necessariamente } d_1 = 0, d_2 = 0, \dots, d_n = 0.$$

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Verificar, se um conjunto de vetores  $S$  é uma base de um espaço vetorial  $E$ , envolve duas combinações lineares, de

- a. ser gerador: para todo  $v \in E$  devem existir  $c_1, c_2, \dots, c_n$  talque  $v = c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_nu_n$
- b. ser LI: se  $0 = d_1u_1 + d_2u_2 + \dots + d_nu_n$ , necessariamente  $d_1 = 0, d_2 = 0, \dots, d_n = 0$ .

Nota: Por estar considerando juntas as duas combinações devemos diferenciar os coeficientes.

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Exemplo 4: Seja o sistema homogêneo  $AX = 0$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 3 & -6 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

O conjunto solução é um espaço vetorial:

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a - 2b \\ a \\ b \end{bmatrix} / a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Formamos o conjunto de três soluções

$$\delta = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}. \quad \delta \text{ é uma base de } S ?$$

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Devemos verificar que  $\delta$  é gerador de  $S$  e é LI.

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Devemos verificar que  $\delta$  é gerador de  $S$  e é LI.

*a.*  $\delta$  é gerador de  $S$  ?

para todo  $v \in S$  devem existir  $c_1, c_2, c_3$  talque

$$v = c_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Devemos verificar que  $\delta$  é gerador de  $S$  e é LI.

a.  $\delta$  é gerador de  $S$  ?

para todo  $v \in S$  devem existir  $c_1, c_2, c_3$  talque

$$v = c_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

b.  $\delta$  é LI ?

$$\text{se } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = d_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + d_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} + d_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ então,}$$

necessariamente  $d_1 = 0, d_2 = 0, d_3 = 0$ .

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Vamos apresentar um processo simplificado para determinar se um conjunto é base.

Observar: os dois sistemas a serem resolvidos são

$$\text{(gerador)} \begin{bmatrix} a - 2b \\ a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{(LI)} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}.$$

Mesma matriz. Podemos resolver simultaneamente.

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Matriz estendida

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & | & a - 2b & | & 0 \\ 2 & 5 & 1 & | & a & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & b & | & 0 \end{bmatrix} \\ \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & | & \frac{1}{2}(a-5b) & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & b & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 & | & 0 \end{bmatrix}.$$

Existem infinitas soluções.  $\delta$  é gerador (existir), mas  $\delta$  não é LI, pois a solução devia ser única.

**$\delta$  não é base de  $S$ .**

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Exemplo 5: Seja o sistema homogêneo  $AX = 0$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 3 & -6 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

O conjunto solução é um espaço vetorial:

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a - 2b \\ a \\ b \end{bmatrix} / a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Formamos o conjunto de três soluções

$$\delta = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}. \quad \delta \text{ é uma base de } S ?$$

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Devemos verificar que  $\delta$  é gerador de  $S$  e é LI.

a.  $\delta$  é gerador de  $S$  ?

para todo  $v \in S$  devem existir  $c_1, c_2$  talque

$$v = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b.  $\delta$  é LI ?

$$\text{se } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = d_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ então,}$$

necessariamente  $d_1 = 0, d_2 = 0$ .

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Observar: os dois sistemas a serem resolvidos são

$$\text{(gerador)} \begin{bmatrix} a - 2b \\ a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{(LI)} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}.$$

Resolvendo simultaneamente.

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & a - 2b & 0 \\ 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & b & 0 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

## 4. Base de um espaço vetorial

---

Também temos  $0 = 0$ , mas não temos infinitas soluções.

A primeira solução dá  $c_1 = a$  e  $c_2 = b$  (existem) portanto é gerador de  $S$ .

A segunda solução dá  $d_1 = 0$  e  $d_2 = 0$  (única solução) portanto é um conjunto LI.

Concluimos que  $\delta$  é **base de  $S$** .

# 5. Dimensão de um espaço vetorial

---

Definição: Seja  $E$  um espaço vetorial.

Se o conjunto de vetores  $\beta \subset E$  é uma base de  $E$ , o **número de elementos da base  $\beta$  é a dimensão do espaço vetorial  $E$ .**

## 5. Dimensão de um espaço vetorial

---

Definição: Seja  $E$  um espaço vetorial.

Se o conjunto de vetores  $\beta \subset E$  é uma base de  $E$ , o **número de elementos da base  $\beta$  é a dimensão do espaço vetorial  $E$ .**

No último exemplo 5, vimos que  $\delta = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$   
é base do espaço vetorial  $S = \left\{ \begin{bmatrix} a - 2b \\ a \\ b \end{bmatrix} / a, b \in \mathbb{R} \right\}$

Portanto, a dimensão de  $S$  é dois:  $\dim(S) = 2$ .